

Keiniänrannan Natura-alueen kasvillisuusseuranta

Taulukossa on esitetty Keiniänrannan yleisimmät kasvit, niiden suhtautuminen ravinnetasoon, vedenpintatasoon ja reunavaikutukseen (Eurola ym. 1994). Lähteen ympäristössä kasvavat yleisimmät kasvit on kursivoitu.

	Trofiataso (minerotrofinen)			Vedenpintataso			Reunavaikutus		
	Oligo	Meso	Eu	Mätäs	Väli	Rimpi	Lähteinen	Luhtainen	Korpinen
Puut ja pensaat									
Harmaaleppä		X	(X)	X	X		(X)	X	X
Hieskoivu	X	X	X	X	X			X	X
Mustuvapaju		X	X	X	X		X	X	
Paatsama		X	X	X	X			X	X
Pihlaja		X	(X)	X					X
Pohjanpunaherukka		X	X	X	X		(X)		X
Tervaleppä		X	X	X	X		(X)	X	(X)
Tuomi		X	X	X			X	X	X
Kenttäkerros									
Harmaasara	X	X			X	X	(X)	X	
Hiirenporras		X	(X)	(X)	X		X	(X)	(X)
Järvikorte	X	X			X	X		X	
Kotkansiipi		X	X		X		X	X	
<i>Kurjenjalka</i>	(X)	X			X	X	(X)	X	
Käenkaali		X	X	X					X
Lehtopalsami		X	X		X	X	X		
<i>Luhtatähtimö</i>		X			X			X	
Mesiangervo		X	X		X		X	X	
Metsäalvejuuri		X		X					X
Metsätähti		X		(X)	X				X
Myrkkykeiso		X	(x)		X	X		X	
Nurmilauha		X			X		X	X	
Peltokorte		X		X	X		(X)	(X)	X
Pitkäpääsara		X	X		X	X	(X)	X	
Punakoiso			X		X	X		X	
<i>Purolitukka</i>		X	X		X	X	X		
Rantamatara		X			X		(X)	X	
Rentukka		X			X	X	(X)	X	
Sudenmarja		X	X	X					X
<i>Suohorsma</i>		X			X	X	X	X	
<i>Suokorte</i>		X	X	(X)	X	(X)	X	X	
Suo-orvokki		X			X			X	
Suo-putki		X			X	X		X	
Terttualpi		X			(X)	X		X	
Vehka		X				X		X	
Velholehti		X	X		X	X			

Keiniänrannan Natura-alueen kasvillisuusseuranta

	Trofiataso (minerotrofinen)			Vedenpintataso			Reunavaikutus		
	Oligo	Meso	Eu	Mätäs	Väli	Rimpi	Lähteinen	Luhtainen	Korpinen
Pohjakerros									
Kiiltolehväsammal		X			X	X	X	X	
Kilpilehväsammal		X			X	(X)	(X)	(X)	X
Lehtosuikerosammal		X		X	X		X		
Lettolehväsammal		X	X		X	X	X		
Lettorahkasammal		X	X		X		X	X	
Luhtakuirisammal		X				X	(X)	X	
Lähdelehväsammal		X	(X)			X	X		
Okarahkasammal		X			X			X	
Otasammal		X	X		X	X	X	X	
Palmusammal		X			X			X	(X)
Kuppilapasammal		X			X	(X)	(X)	X	
Yhteensä	3 (1)	45	19 (3)	13 (2)	37 (1)	19 (3)	16 (12)	31 (4)	12 (3)
	4	45	22	15	38	22	28	35	15